DESCRIPTION DE QUELQUES HOMOPTÈRES NOUVEAUX

DE L'OASIS DE GIARABUB (CYRÉNAÏQUE)

ET DE LA SOMALIE ITALIENNE

PAR LE Dr V. LALLEMAND, UCCLE

Duilius (Haplacha) seticulosus Lethierry

nov. var. **punctata**

Diffère de l'espèce par la présence d'un gros point noir sur le milieu de la troisième nervure apicale et fréquemment de deux traits brun-noir au sommet du vertex; cette variété ressemble par ces deux caractères à *D. bipunctatus* Fieber, mais s'en distingue par les granulations noires des élytres, par le front et le clypeus séparés par une fine suture.

Habitat: Oasis de Giarabub (C. Confalonieri).

Oliarius Patrizii nov. sp.

Front, clypeus bruns, vertex noir, toutes leurs carènes jaune-brunâtre; pronotum jaune un peu brunâtre, à taches noires derrière les yeux; écusson noir; lames scapulaires à milieu brun bordé de jaune-sale; ailes et élytres hyalin trouble, les derniers à nervures blanchâtres, portant de fines et nombreuses granulations brunâtres et devenant noires à la partie apicale, toutes les nervures transversales sont bordées de brun-noir, stigma brun, bordé à l'intérieur d'un talus granulé, noir; sternum noir et jaune; abdomen à segments noirs bordés de blanc-jaunâtre; pattes jaunâtres, striées de brun sur les cuisses et les tibias médians et postérieurs.

Vertex 1 fois $^1/_2$ plus long que large, une fine carène médiane sur sa partie postérieure; tête à peu près aussi large que le pronotum; sur les élytres, cubitus bifurqué plus près de la

base que le radius (qui se bifurque en arrière du milieu); trois épines sur les tibias postérieurs.

Longueur: 6 mm.

Habitat: Somalie, Belet Amin (Giuba), avril 1923 (Patrizi).

Espèce dédiée à M. le Marquis S. Patrizi.

Dendrona Gestroi nov. sp.

Tête, pronotum d'un jaune légèrement brunâtre; sommet du front noir, yeux brun-rouge; écusson jaune-brun, plus foncé par places; élytres couleur mastic, un peu plus brun sur le clavus, avec bandes ou taches brun-noir: une première bande sur le clavus entre la suture et la première nervure anale, s'étendant depuis la base jusqu'à la pointe, une deuxième sur le corium partant à peu près du milieu de la suture, s'incurvant et rejoignant une troisième longitudinale, située entre les branches du médian, un amas de petites taches en formant une grande, plus ou moins triangulaire, à cheval sur la nervure subcostale et au milieu de l'élytre, un second amas plus petit non loin du bord interne, au milieu de la distance séparant la pointe du radius et le bord apical, enfin une tache longitudinale brune partant de la partie médiane et s'étendant jusque près du bord externe au devant de l'angle apical; ailes hyalines, légèrement jaunâtres, à nervures brunes; sternum, pattes, abdomen jaune-brunâtre plus ou moins foncé.

Front trois fois aussi long que large au dessus du clypeus; vertex deux fois aussi long que large, aplati; bord costal des élytres non ondulé; membrane costale irrégulièrement réticulée; deux lignes à la partie apicale du corium; deux épines sur les tibias postérieurs.

Longueur: 16 mm.

Habitat: Somalie, Belet Amin (Giuba), avril 1923 (Patrizi).

Je dédie cette espèce à M. le professeur Gestro, directeur du Musée Civique d'Histoire naturelle « Giacomo Doria » de Gênes.

Uysanus Lestagei nov. sp.

Tête, pronotum jaune un peu grisâtre, sont noirs: sur le front, un point dans l'angle supérieur de chaque côté, sur les

joues, au dessus et au devant des yeux des petites taches (pouvant former bande), sur le vertex six petites taches, deux en avant et deux de chaque côté, sur le pronotum, quatre points en deux rangées le long de la carène longitudinale médiane, ainsi que de petites taches (5 à 6) en dehors des carènes latérales. Ecusson un peu plus foncé que la tête et le pronotum, sur la partie antérieure une série de taches disposées en bande transversale et en arrière quatre taches, deux petites mèdianes et deux latérales plus grandes (une de chaque côté près du bord latéro-postérieur). Elytres jaune-gris sale, par places, sur les nervures, des points ou des lignes brunes. Ailes blanc-jaunâtre. Corps jaune-gris; sur le rostre une ligne médiane brune.

Vertex plus large que long; sur le corium trois secteurs partant de la cellule basale; membrane costale environ trois fois aussi large que la cellule costale; une seule ligne subapicale. Une épine sur les tibias postérieurs.

Longueur: 13 mm.

Habitat: Somalie, Bidi-Scionde, Basso Giuba, 1924 (Patrizi).

Je dédie cette espèce à Mr. Lestage, Directeur de l'aquarium de Bruxelles.

Allygus somalianus nov. sp.

Sur le front noir des lignes ou des points d'un blanc-jaunâtre, formant des stries transversales. Vertex blanc-jaunâtre ou jaune-brunâtre clair, au bord antérieur, de chaque côté, une ligne légèrement convexe, s'étendant jusqu'aux yeux, derrière celle-ci, quatre petites lignes, deux médianes un peu obliques et deux latérales transversales, sur la partie médiane entre les yeux, une bande transversale, plus étroite au milieu (de chaque côté elle peut s'épaissir et même former des triangles dirigés vers l'arrière), entre cette dernière et le bord postérieur, une fine ligne longitudinale, noires. Sur le pronotum jaune-brunâtre, une tache derrière les yeux et plusieurs autres plus petites sur la partie antérieure formant plus ou moins une bande transversale, noires. Sur l'écusson, une large bande transversale, basale et deux forts triangles noirs, le restant blanc-jaunâtre, tacheté de noir. Elytres jaune-brunâtre clair, à nervures d'un blanc légèrement grisâtre, bordées de noir, cette couleur peut envahir complètement quelques

cellules. Ailes enfumées, plus brunes vers la partie apicale. Sternum brun et jaune. Abdomen à segments bruns bordés de jaune. Pattes antérieures noires tachées de jaune ou de jaune-brun, médianes et postérieures jaunes ou jaune-brun plus ou moins tachées de noir.

Longueur : 4,5 à 5 mm.

Habitat : Somalie, Belet Amin (Giuba), avril 1923 (Patrizi).